

Résultats SSI - Explications concernant les données de la fenêtre interactive

Cette section décrit brièvement les différentes valeurs qui apparaissent dans les fenêtres interactives. Celles-ci peuvent varier en fonction du type de procédure chirurgicale. La légende ci-dessous (a-i) explique spécifiquement chaque paramètre. Les exemples présentés dans le tableau sont fictifs.

a) Taux d'infection ajusté	x% (95% CI) [3.5% (0.3 – 2.9)]		
b) Taux d'infection brut	n / N, x% (95% CI) [4/200, 2%, (0.1 – 2.1)]		
c) Par type d'infection	superficielle : n, x% [1, 0.5%]	profonde : n, x% [2, 1%]	organe/espace : n, x% [1, 0.5%]
d) Par catégorie de risque NNIS	0: n, x% [1, 0.5%]	1: n, x% [2, 20%]	2: n, x% [1, 10%]
e) Par classe de contamination	II: n, x% [2, 2.8%]	III: n, x% [1, 3.3%]	IV: n, x% [1, 10%]
f) Par abord chirurgical	laparoscopie/minimal-invasive : n, x% [1, 5%]		laparotomie : n, x% [3, 15%]
g) Prop. d'AB-proph. ≤ 1 h avant OP (classe de contam. II)	x% [78%]		
h) Proportion de suivis complétés	x% [95%]		
i) Estimation de la qualité de la surveillance	Nombre de validations x	Première validation : Date x/50, \tilde{x} [34/50, 38.9]	Dernière validation : Date x/50, \tilde{x} [36/50, 39.2]

- Taux d'infection ajusté selon l'indice de risque NNIS en pourcent et intervalle de confiance à 95%
- Taux d'infection brut : n = nombre d'infections, N = nombre d'opérations, taux d'infection en pourcent, intervalle de confiance à 95%
- Taux d'infection brut par type d'infection : incisionnelle superficielle, incisionnelle profonde et d'organe/espace : n = nombre d'infections, taux d'infection en pourcent basé sur le taux brut. Depuis le 1er octobre 2021, seules les infections d'organe/espace (infections associées aux prothèses) en chirurgie orthopédique (genou et hanche) sont enregistrées.
- Taux d'infection brut par catégorie de risque NNIS 0 - 3 : n = nombre d'infections, taux d'infection en pourcent basé sur le taux brut
- Taux d'infection brut par classe de contamination II, III ou IV : n = nombre d'infections, taux d'infection en pourcent basé sur le taux brut. Ces valeurs sont publiées pour les interventions suivantes : appendicectomie, cholécystectomie et chirurgie du colon.
- Taux d'infection brut par abord chirurgical : n = taux d'infection par laparoscopie ou par laparotomie, taux d'infection en pourcent basé sur le taux brut
- Proportion d'antibioprophylaxie administrée en temps opportun (dans un délai d'une heure avant l'incision) en pourcent, pour la classe de contamination indiquée (I à IV), exceptions : cholécystectomies et cure de hernies
- Proportion de suivis (follow-up) complétés en pourcent
- Nombre, résultats et dates des validations effectuées sur place de la qualité de la surveillance pour la première et la dernière validation (indépendant de la période de mesure) : x = score de l'hôpital variant entre un minimum de 0 point (insuffisant) et un maximum de 50 points (excellent), \tilde{x} = valeur médiane pour la Suisse