

INFECTIONS DU SITE CHIRURGICAL SWISSNOSO



- Prothèses de genou en électif
- Appendicectomies (ablation de l'appendice)
- Laminectomies (opération de la colonne vertébrale)
- Cholécystectomies (ablation de la vésicule biliaire)
- Hystérectomies (ablation de l'utérus)
- Chirurgie vasculaire artérielle des membres inférieurs
- Bypass gastrique


TYPES D'INTERVENTION SÉLECTIONNÉS



Nombre hôpitaux / cliniques



Nombre de patient-e-s




RÉSULTATS DE LA MESURE 2022




Taux d'infection

Proportion d'infections du site chirurgical



Profondeurs des infections

- Infections superficielles
- Infections profondes
- Infections d'organe/espace



Pour les prothèses de hanche, seules les infections de l'organe/espace sont enregistrées.

Suivi

Proportion d'interventions avec suivi complet

Durée du suivi
– sans implant : 30 jours
– avec implant : 90 jours



Antibioprophylaxie en temps opportun

Proportion de patient-e-s ayant reçu une antibioprophylaxie dans l'heure précédant l'intervention chirurgicale



Les résultats de la mesure en détail :



www.anq.ch



TENDANCE : Depuis le début de la surveillance en 2011, une baisse significative des taux d'infection a été observée pour 8 types d'interventions, tandis qu'une tendance à la baisse non statistiquement significative a été observée pour 3 interventions et une augmentation significative pour 3 autres.