

Guide de lecture des graphiques

Importance des symptômes (évaluation par des tiers et autoévaluation)

Axe x	Sur l'axe x, les valeurs des cliniques sont classées par ordre croissant de leur taux de retour (taux de réponse). Le taux de retour comprend le nombre de cas complets et incomplets, ainsi que les dropouts non influençables. Un cas est considéré comme complet, lorsque toutes les variables (données de mesure à l'admission et à la sortie ainsi que les données minimales et données supplémentaires Psychiatrie de l'OFS au format ANQ) ont été livrées avec une valeur valable. Pour les cas incomplets, certaines variables principales (p. ex. date du relevé) et le nombre d'items prescrits par instrument de mesure doivent obligatoirement être disponibles.
Axe y	L'axe y présente le <u>résultat de mesure épuré des risques</u> de la réduction de l'importance des symptômes. La valeur comparative représentée indique de combien la réduction de l'importance des symptômes de chaque clinique est inférieure ou supérieure à la moyenne du groupe de référence.
Ligne zéro	La ligne grise horizontale (ligne zéro) indique la moyenne globale de la réduction de l'importance des symptômes <u>épurée des risques</u> de toutes les cliniques participantes.
Ligne bleue	La ligne bleue verticale qui traverse les points de données indique l'intervalle de confiance de 95% d'une clinique, à savoir la zone dans laquelle la valeur de mesure évolue avec une probabilité de 95%.
Zone blanche	La zone blanche de la réduction de l'importance des symptômes comprend les cliniques dont les résultats de mesure ajustés aux risques affichent une réduction moyenne de l'importance des symptômes chez les patientes et patients. Dans les cliniques dont l'intégralité de l'intervalle de confiance se situe dans cette zone, il y a lieu de considérer avec une probabilité de 95% qu'une clientèle représentative de la Suisse aurait connu une réduction de l'importance des symptômes pendant son séjour (résultat statistiquement significatif).
Zone orange	La zone orange de la hausse de l'importance des symptômes comprend les cliniques dont les résultats de mesure ajustés aux risques affichent une réduction moyenne de l'importance des symptômes chez les patientes et patients. Dans les cliniques dont l'intégralité de l'intervalle de confiance se situe dans cette zone, il y a lieu de considérer avec une probabilité de 95% qu'une clientèle représentative de la Suisse aurait connu une augmentation de l'importance des symptômes pendant son séjour (résultat statistiquement significatif).
Zone bleue	Les cliniques situées dans la zone bleue n'ont pas atteint la valeur de retour attendue initialement fixée. La valeur attendue est de 90% pour HoNOS/HoNOSCA et de 60% pour BSCL/HoNOSCA-SR.

Les symboles suivants sont utilisés pour représenter les valeurs comparatives spécifiques aux cliniques :



La clinique a obtenu une qualité des résultats significativement supérieure à celle attendue sur le plan statistique (l'intervalle de confiance de la clinique se situe au-dessus de la ligne zéro).

-  La clinique a obtenu une qualité des résultats significativement inférieure à celle attendue sur le plan statistique (l'intervalle de confiance de la clinique se situe au-dessous de la ligne zéro).
-  La clinique a obtenu une qualité des résultats qui ne diverge pas significativement sur le plan statistique (l'intervalle de confiance de la clinique coupe la ligne du zéro).
-  Les cliniques avec moins de 30 cas évaluable sont présentées sans intervalles de confiance. En présence de petits échantillons, la représentativité des données n'est pas garantie et la pertinence est limitée. Ces valeurs doivent donc être interprétées avec grande précaution.

Le **processus de recherche** permet de trouver la position de la clinique ou du site clinique souhaité. En plaçant le curseur sur le symbole d'une clinique, une fenêtre pop-up apparaît avec les informations suivantes :

- Clinique, site clinique
- Valeur de comparaison (y compris l'intervalle de confiance inférieur et supérieur à 95%)
- Taux de retour (proportion de cas évaluable sur le nombre de cas transmis (%)), nombre total de cas évalués (n)
- Eventuel commentaire d'une clinique

Mesures limitatives de liberté

Axe x	Sur l' axe x , les valeurs des cliniques sont classées par ordre croissant du numéro de clinique.
Axe y	L'axe y présente la proportion de cas concernés (= cas avec au moins une mesure limitative de liberté) <u>sans épuration des risques</u>. La ligne grise horizontale indique la proportion globale de mesures limitatives de liberté de toutes les cliniques participantes.

Les symboles suivants sont utilisés pour représenter les mesures limitatives de liberté :



La clinique fait partie des 25% des cliniques présentant la plus forte proportion de cas concernés par des mesures limitatives de liberté.



La clinique fait partie des 25% des cliniques présentant la plus faible proportion de cas concernés par des mesures limitatives de liberté.



La clinique fait partie des 50% des cliniques présentant une proportion moyenne de cas concernés par des mesures limitatives de liberté.



La clinique présente moins de 30 cas évaluable. En raison de la base de données trop faible, ces cas n'ont pas été pris en compte dans le calcul des quartiles.

Le **processus de recherche** permet d'obtenir la position de la clinique ou du site clinique souhaité (de manière analogue à l'importance des symptômes). En plaçant le curseur sur le symbole d'une clinique, une fenêtre pop-up apparaît avec les informations suivantes :

- Clinique, site clinique
- Nombre de cas concernés par des mesures limitatives de liberté, en pourcentage (%) et en nombre absolu (n) du nombre total de cas évalués (n) d'une clinique
- Eventuel commentaire d'une clinique

Tableau

Le tableau fournit un aperçu détaillé des mesures limitatives de liberté appliquées. Les cliniques sont également réparties en quartiles dans le tableau (25% avec les valeurs les plus faibles, 50% avec des valeurs moyennes et 25% avec les valeurs les plus élevées). Les cliniques présentant moins de 30 cas ou aucun cas évaluable sont dûment signalées. En raison du faible nombre de cas, il a été décidé de renoncer à cette forme de présentation pour la psychiatrie d'enfants et d'adolescents.

Fonction zoom

Il est possible d'agrandir certaines parties des graphiques à l'aide d'une fonction zoom. La zone souhaitée peut être sélectionnée à l'aide du bouton gauche de la souris.