

Portail web ANQ – Graphique interactif

## Informations sur la mesure de l'indépendance fonctionnelle dans les actes ordinaires de la vie quotidienne et sur la présentation à l'aide du SCIM

---

### Réadaptation paraplégiologique

---

Le score Spinal Cord Independence Measure (SCIM) mesure l'indépendance fonctionnelle des patientes et patients atteints d'une paralysie médullaire/lésion de la moelle épinière. L'évaluation se compose de 19 items dans les domaines des soins personnels, de la respiration, du contrôle sphinctérien et de la mobilité. Elle est complétée par le personnel clinique sur la base d'observations faites dans le quotidien clinique. Pour chaque item, les patientes et patients peuvent obtenir de 0 à 15 points maximum sur une échelle de réponse à plusieurs niveaux. Les valeurs des différents items sont additionnées et peuvent varier entre 0 (indépendance fonctionnelle minimale) et 100 (indépendance fonctionnelle maximale).

---

Afin d'évaluer les progrès individuels des patientes et patients, chaque mesure est réalisée à la fois à l'admission et à la sortie de réadaptation.

Les mesures prescrites dans le plan de mesure national Réadaptation servent à l'assurance et au développement de la qualité à l'échelle clinique, ainsi qu'à la comparaison nationale. Les différents résultats de mesure ne représentent que des aspects partiels et ne permettent donc pas de tirer des conclusions sur la qualité globale d'une clinique.