



RÉADAPTATION EN MÉDECINE INTERNE



Maladies les plus fréquentes

- 28.1% Tumeurs
- 19.5% Maladies appareil digestif
- 16.2% Maladies système ostéo-articulaire & muscles, lésions & complications
- 7.8% Maladies appareil circulatoire

Durée de traitement moyenne

22.2 jours



Réadaptation stationnaire



Nombre de patientes et patients
6423

Âge moyen
68.9 ans

88.8% hôpital de soins aigus

Séjour avant admission en réadaptation

90.5% à domicile

Séjour après sortie de réadaptation

51.0%

49.0%

Objectif : rétablissement ou maintien de la capacité de participer à la vie publique et sociale

RÉSULTATS DE MESURE 2024

Objectif de participation

Objectif que la patiente / le patient souhaite atteindre jusqu'à la sortie de réadaptation. Les objectifs liés au logement sont le plus souvent choisis.



A l'admission :

fixation de l'objectif principal individuel dans les domaines du logement, du travail et de la vie socioculturelle



A la sortie :

évaluation de l'atteinte de l'objectif en %

Capacité fonctionnelle dans les actes ordinaires de la vie quotidienne

Evaluation d'une sélection de capacités motrices et cognitives de la patiente ou du patient par l'équipe de réadaptation



Moyenne des points sur une échelle de 0-60 à l'admission et à la sortie

Capacités motrices



Manger & boire



Soins personnels



Prendre un bain & se doucher



S'habiller & se déshabiller



Utilisation des toilettes



Déambulation



Monter les escaliers



Transfert

Capacités cognitives



Communication



Interaction sociale



Résolution des problèmes



Mémoire

Tendance

Le niveau fonctionnel des patientes et patients au début de la réadaptation en médecine interne a diminué au cours des six dernières années, mais une légère tendance à la hausse a été observée à la sortie de réadaptation. Dans l'ensemble, on constate une tendance à l'amélioration des progrès fonctionnels pendant la réadaptation.



Résultats détaillés

www.anq.ch